

Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa

Suositus annettu 17.9.2008.

Terveydenhuollon menetelmää voi käyttää harkiten.



Voidaan käyttää yksilöllisen harkinnan perusteella ja potilaan suostumuksella, kunnes vertailevat tutkimukset ovat valmistuneet.

Vaikuttavuus: Tieto riittävästä tehosta perustuu riittäviin potilassarjoihin, mutta pitkäaikaisseurantatieto puuttuu.

Turvallisuus: Vaihtoehtoisiin menetelmiin verrattuna riittävä perustuen potilassarjoihin.

Kustannukset: Vaihtoehtoisiin menetelmiin ja lääkkeisiin verrattuna edullinen. Kustannusvaikuttavuustieto puuttuu.

Rajoitukset: Valmisteella ei ole myyntilupaa tähän indikaatioon.

Työnjako: Suositellaan keskittämistä yksiköissä.

Katsaus, johon suositus perustuu:

Tapani Palosaari, Eeva Mäkinen, Marko Kataja, Pirjo Räsänen, Minna Kaila, Hannu Uusitalo. [Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta? \(pdf 98 kt\)](#) Suomen Lääkärilehti 2008;63(24):2229–36.