

Atsasiidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa

Liikennevalo: Keltainen

Vaikuttavuus: Tutkimustietoa on vähän. Atsasiidiini saattaa lisätä elinaikaa kuukausia verrattuna intensiiviseen solunsalpaajahoittoon.

Turvallisuus: Atsasiidiinihoitoa saaneilla on sytopeniaa yhtä paljon, mutta infektioiden määrä on pienempi kuin solunsalpaajahoidoita saaneilla.

Kustannukset: Hoitokustannukset ovat samankaltaiset kuin intensiivisen solunsalpaajahoidon.

Suomessa puolen vuoden hoitokustannukset ovat molemmissa vähintään 35 000 euroa eli huomattavasti korkeammat kuin tukihoidon (n. 5 000 euroa).

Kliininen suositus: Suuren riskin MDS-potilaille atsasiidiinia voidaan käyttää vaihtoehtona solunsalpaajahoidolle.

Rajoitukset: -

Työnjako: Hoidosta vastaavat hematologit ja verisairauksiin erikoistuneet sisätautilääkärit.

HALO-katsaus: HALO-ryhmä: Juvonen E, Siitonen T, Sintonen H, Isojärvi J, Sihvo S.

Atsasiidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa. Suom Lääkäril 2011;66:457-62



HALO-katsauksissa arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä.

HALO-neuvottelukunta antaa katsausten perusteella liikennevaloin koodattuja suosituksia käyttöönotosta.

Suosituksot julkaistaan Lääkärilehdessä.

Liikennevalo määritetään vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten mukaan.

Vihreä = käytä,
Keltainen = käytä tietoa keräten,
Punainen = älä käytä.

Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa

Liikennevalo: Keltainen

Vaikuttavuus: Satunnaistettujen tutkimusten tulokset leikkaushaavan kestopuudutuksen tehosta kivunlievityksessä ovat epäytentäisiä, eikä kestopuudutuksen ole yksiselitteisesti osoitettu vähentävän leikkauksenjälkeistä pahoinvointia, oksentelua tai sairaalassaoloaikaa.

Turvallisuus: Merkittäviä turvallisuusriskejä ei ole osoitettu.

Kustannukset: Potilaskohtainen kustannus on noin 80-220 euroa sisältäen pumpun katetreineen, täyttöruiskun ja puudutteen.

Kliininen suositus: Säännönmukainen kestopuudutuksen käyttö leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa ei ole perusteltua, mutta sitä voidaan harkita vaihtoehtona tilanteissa, joissa kivun lievitys muilla menetelmillä on ongelmallista.

Rajoitukset: -

Työnjako: -

HALO-katsaus: HALO-ryhmä: Lempinen J, Kontinen VK, Paavola M, Isojärvi J, Roine RP, Ikonen TS.

Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa. Suom Lääkäril 2011;66:167-72.



HALO-katsauksissa arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä.

HALO-neuvottelukunta antaa katsausten perusteella liikennevaloin koodattuja suosituksia käyttöönotosta.

Suosituksot julkaistaan Lääkärilehdessä.

Liikennevalo määritetään vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten mukaan.

Vihreä = käytä,
Keltainen = käytä tietoa keräten,
Punainen = älä käytä.