

## الإصابات بالعدوى ببكتيريا المكورات العقدية (A-streptokokki)

الإصابات بالعدوى بالمكورات العقدية A للبلعوم وللجلد من الممكن أن تظهر على شكل أوبئة لدى العائلات وحضانات الأطفال والمدارس. من الممكن أن تسبب المكورات العقدية التهاب البلعوم ("الذبحة الصدرية") أو الحمى القُرْمُزِيَّةُ أو الحصف الجلدي أي القوباء أو التهاب الجلد حول الشرج (التهاب الجلد حول فتحة الشرج أي "الالتهابات في المؤخرة").

أعراض الحمى القُرْمُزِيَّةُ من الممكن أن تكون أمورًا منها ألم الحلق والسخونة والصداع واللسان الأحمر بشكل ساطع والطفح الجلدي الأحمر والذي يُسبب الحكّة. أعراض التهاب البلعوم من الممكن أن تكون أمورًا منها ألم الحلق وأغطية فاتحة اللون في الحلق وسخونة. أعراض الحصف الجلدي أي القوباء تكون في العادة طفح جلدي سريع الانتشار وتنتشأ عنه إفرازات وعليه أغشية تميل إلى اللون الأصفر، وتكون أكثر شيوعًا حول الفم والأنف. أعراض التهاب الجلد حول الشرج هي طفح جلدي أحمر ويثير حكّة في منطقة الجلد المحيطة بفتحة الشرج.

### الإصابة بالعدوى

تنتشر المكورات العقدية A من خلال الإفرازات على شكل عدوى بالطقيريات وبالملامسة بالتواصل عن قُرب. من الممكن منع انتشار المكورات العقدية A من خلال النظافة الجيدة لليدين. التهاب البلعوم والحمى القُرْمُزِيَّةُ الذي تُسببه المكورات العقدية A يكون مُعديًا لمدة أسبوع قبل ظهور الأعراض. الحصف الجلدي أي القوباء يكون مُعديًا عندما تبدأ الأعراض. تبدأ أعراض الإصابة بالعدوى بالمكورات العقدية A في العادة بعد 1 - 4 أيام، ولكن فترة كمون المرض من الممكن أن تستمر حتى لمدة شهر.

إذا كان هناك شك بالإصابة بالعدوى التي تُسببها المكورات العقدية A، فيتوجب التواصل مع الرعاية الصحية.

### العلاج

يتم علاج المكورات العقدية A دائمًا بالمضاد الحيوي. يتم علاج الحصف الجلدي أي القوباء حسب الحالة أما بمستحضر العلاج الموضعي أو بالمضاد الحيوي عن طريق الفم.

#### بخصوص التهاب البلعوم والحمى القُرْمُزِيَّةُ

- يتم تغيير فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان بعد 48 ساعة من بدء العلاج بالمضاد الحيوي
- تُغَيَّرُ فوطة الأيدي يوميًا
- يتم غلي اللهايات وعلب اللهايات في الماء يوميًا
- يتم غسل أطقم الأسنان وجسور الأسنان وما شابه ذلك يوميًا
- يتم غسل لعب النوم للأطفال بعد 48 ساعة من بدء العلاج بالمضاد الحيوي

#### بخصوص الحصف الجلدي أي القوباء والتهاب الجلد حول الشرج

- تُغَيَّرُ الفوط والملابس الداخلية يوميًا
- يتوجب تجنب لمس مناطق الجلد المُلتهبة
- يتم تغيير أغطية الفراش بعد 48 ساعة من بدء العلاج بالمضاد الحيوي
- يتم غسل لعب النوم للأطفال بعد 48 ساعة من بدء العلاج بالمضاد الحيوي

التنظيف الأسبوعي العادي يكفي للتنظيف (كنس الغرف بالمكنسة الكهربائية ومسح الأسطح ومقابض أبواب المراحيض والصنابير بعناية).

إذا تم إثبات أن الطفل لديه أي من الالتهابات أعلاه، فيتوجب الإبلاغ عن ذلك إلى مكان الرعاية أو المدرسة. من الممكن العودة إلى مكان الرعاية أو المدرسة، عندما تنقضي 24 ساعة على بدء أخذ المضاد الحيوي عن طريق الفم. بخصوص الحصف الجلدي أي القوباء من الممكن العودة إلى مكان الرعاية أو المدرسة، عندما تنقضي 48 ساعة على بدء العلاج الموضعي.



**Pohde**

Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

إرشادات

2(2)

وحدة الأمراض المعدية

23.4.2024

[https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- \(THL\) إرشادات إضافية من صفحات مؤسسة الصحة والرفاهية \(rokokukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/a-ryhman-streptokokki](https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- (THL) إرشادات إضافية من صفحات مؤسسة الصحة والرفاهية (rokokukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/a-ryhman-streptokokki)

أنظر أيضًا من المكتبة العامة الصحية الأمراض المعدية وأمراض الالتهابات وحضانة الأطفال  
[01200https://www.terveyskirjasto.fi/dlk](https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200)