

## Streptokock A-infektioner

Svalg- och hudinfektioner som orsakas av streptokock A kan förekomma som epidemier i familjer, på daghem och i skolor. Streptokock A kan orsaka svalginfektion (halsfluss), scharlakansfeber, svinkoppor eller perianal dermatit (hudinflammation kring analöppningen, det vill säga stjärtlfluss).

Symtomen på scharlakansfeber kan vara bland annat halsont, feber, huvudvärk, klarröd tunga och rodnande utslag som kliar. Symtom på svalginfektion kan vara bland annat halsont, ljusa beläggningar i svalget och feber. Symtomen på svinkoppor är vanligtvis gulaktiga, utsöndrande utslag som sprider sig snabbt. Vanligast är att få svinkoppor runt munnen och näsan. Symtomen på perianal dermatit är rodnande och kliande utslag i huden runt ändtarmen.

### Smitta

Streptokock A sprider sig via sekret genom droppsmitta och till närkontakter genom kontaktsmitta. Spridningen av streptokock A kan förebyggas med god handhygien. Svalginfektion och svinkoppor som orsakas av streptokock A smittar i en vecka innan symtomen börjar. Svinkopporna smittar när symtomen har börjat. Symtomen på streptokock A-infektion börjar i allmänhet inom en till fyra dygn, men inkubationstiden kan vara upp till en månad.

Om man misstänker någon infektion orsakad av streptokock A, ska man kontakta hälso- och sjukvården.

### Behandling

Streptokock A-infektion behandlas alltid med antibiotika. Svinkoppor behandlas från fall till fall antingen med preparat för lokalbehandling eller antibiotika som tas genom munnen.

Vid svalginfektion och scharlakansfeber

- byts tandborste och tandkräm 48 timmar efter att antibiotikabehandling har påbörjats
- byts handduken dagligen
- kokas nappar och nappplådor dagligen
- tvättas tandproteser, -skenor o.d. dagligen
- tvättas barnens gosedjur 48 timmar efter att antibiotikabehandling påbörjats

Vid svinkoppor och perianal dermatit

- byts handdukar och underkläder dagligen
- ska beröring av infekterade hudområden undvikas
- byts sängkläder 48 timmar efter att antibiotikabehandlingen påbörjats
- tvättas barnens gosedjur 48 timmar efter att antibiotikabehandling påbörjats

Infektionsenheten

23.4.2024

Det räcker med vanlig veckostädning (dammsugning av rum och omsorgsfull rengöring av ytor, toalettens dörrhandtag och kranar).

Om det konstateras att ett barn har någon de ovan nämnda infektionerna, meddelas dagvårdsplatsen eller skolan om detta. Barnet kan återvända till dagvårdsplatsen eller skolan när det har gått 24 timmar från det att behandlingen med antibiotika genom munnen inleddes. När det gäller svinkoppar kan barnet återvända till dagvårdplatsen eller skolan när det har gått 48 timmar från det att lokalbehandlingen inleddes.

Mer anvisningar hittar du på THL:s webbplats <https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/a-ryhman-streptokokki>

Se även Terveyskirjasto, Infektiot ja päivähoido (på finska)  
<https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200>