

## Стрептококковые инфекции

Инфекции ротоглотки и кожи, вызываемые стрептококками, могут возникать в виде эпидемий в семьях, детских садах и школах. Стрептококк А может вызывать фарингит («ангину»), скарлатину, импетиго или перианальный дерматит (воспаление кожи вокруг заднего прохода, или «ягодичную ангину»).

Симптомы скарлатины могут выражаться в боли в горле, повышении температуры, головной боли, покраснении языка, эритематозной и зудящей сыпи. Симптомами фарингита могут быть: боль или легкое першение в горле и повышенная температура. Импетиго обычно характеризуется сыпью, которая быстро распространяется, происходят выделения и имеется желтоватый оттенок, чаще всего вокруг рта и носа. Симптомами перианального дерматита являются эритематозные и зудящие высыпания на участке кожи вокруг заднего прохода.

### Заражение

Стрептококк А передается с выделениями воздушно-капельным путем и при тесном контакте. Распространение стрептококка А можно предотвратить при соблюдении правил гигиены рук. От момента заражения стрептококковым фарингитом и скарлатиной должно пройти не менее недели, прежде чем появятся симптомы. Импетиго переходит в заразную форму, когда появляются симптомы. Симптомы стрептококковой инфекции обычно проявляются в течение 1-4 дней, но инкубационный период может длиться до месяца.

При подозрении на стрептококковую инфекцию обратитесь к своему лечащему врачу.

### Лечение

Стрептококковая инфекция А всегда лечится антибиотиками. Для лечения импетиго назначаются в зависимости от конкретного случая местные или пероральные антибиотики.

При фарингите и скарлатине

- зубную щетку и пасту следует заменить через 48 часов после начала лечения антибиотиками
- полотенце для рук следует менять ежедневно
- соски-пустышки следует кипятить ежедневно
- зубные протезы, рейлинги и т. д. следует мыть ежедневно
- игрушки, с которыми спят дети, следует мыть через 48 часов после начала лечения антибиотиками

При импетиго и перианальном дерматите

- полотенца и нижнее белье следует менять ежедневно

Инфекционное отделение

23.4.2024

- следует избегать контакта с воспаленными участками кожи
- постельное белье следует заменить через 48 часов после начала лечения антибиотиками
- игрушки, с которыми спят дети, следует мыть через 48 часов после начала лечения антибиотиками

В качестве уборки достаточна обычная еженедельная уборка (чистка комнатных помещений пылесосом и тщательное протирание поверхностей, а также дверных ручек туалета и водопроводных кранов).

Если у ребенка диагностирована какая-либо из вышеперечисленных инфекций, следует сообщить об этом в детский сад или школу. В детский сад или школу можно приходить через 24 часа после начала местной терапии. В случае импетиго можно вернуться в детский сад или школу через 48 часов после начала местной терапии.

Дополнительные инструкции можно найти на веб-сайте Ведомства здравоохранения (THL) <https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/a-ryhman-streptokokki>

Смотрите также информацию в онлайн-библиотеке здоровья под заголовком Инфекции и посещение детских учреждений (Infektiot ja päivähoito) <https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200>